



診療所だより ～やまゆりの風～ 『ハチに刺された場合の対処法』

2度3度と繰り返しハチに刺されると、ハチ毒に対する抗体ができ、アナフィラキシー（アレルギー反応）を起こすことがありますので注意が必要です。

もし蜂に刺されたら、どうしたらいいの……？

すみやかにその場から離れてください！！

アシナガバチやスズメバチは何度も襲ってくる可能性があります。近くに蜂の巣がある可能性もあるので、身を低くしてその場を離れましょう。

蜂の針が刺さっていたら取り除く

爪ではじき飛ばすようにして針を取り除きましょう。針を取り除く際は、針の根元にある毒袋をつまむと毒を体内に注入してしまう危険性があるので注意してください。

毒液を絞り出すようにして、傷口を流水でよく洗いながしましょう

毒液は水に溶けやすいので、流水にさらすと毒を薄める効果が期待できますので、刺された所を指で強くつまんで毒液を絞り出し、水でよく洗い流しましょう。

※「毒液を口で吸いだす」のは、口の中に傷があると傷口から毒液が入り危険なのでやめてください。

刺された所を冷やし安静にしましょう

保冷剤や氷のうなどで刺された所を冷やし、毒が体内に回るのを抑えます。

アナフィラキシー症状が現れた場合はすぐに救急車を要請しましょう

●主なアナフィラキシー症状

声がかすれる 呼吸がしにくい 我慢できないほどの腹痛 全身に蕁麻疹 吐き気 意識がもうろうとしている など、刺された直後から1時間以内に何らかの症状が出る場合があります。アナフィラキシーは症状が出てすぐに治療を始めれば、多くの場合生死に関わることはありません。ただし、軽いアレルギー症状から数時間後に急変する場合もあるので、自己判断せずすぐに医療機関を受診しましょう。

夏季休診のお知らせ 8月15日(月)から8月17日(水)まで

福島町国民健康保険診療所

やまゆりクリニック

◎内科・消化器内科・小児科／院長 光銭健三
☆専門外来 ピロリ菌外来・禁煙外来・認知症外来

診療案内						
診療時間	月	火	水	木	金	土
午前 8:30～11:45	●	●	●	●	●	▲
午後 1:00～5:00	●	●	●	訪問診療	●	-
午後 5:00～6:30	-	●	-	-	-	-

※受付は、診療時間終了の30分前までです。

火曜日は夜間診療有
木曜日は12時まで診療
▲第2・4土曜日のみ診療

■お問い合わせ先
福島町字福島139番地1
☎(0139) 47-3101